




# Facteurs de risque - Proportion de naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine

Proportion de naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine, CLSC de Montréal - Centre, 1998-2000


## Proportion de naissance



## Naissances ayant un retard de croissance intra-utérine (1994-1998) %



## Proportion de naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine selon la catégorie de revenu, Montréal-Centre, 1989-1993 et 1994-1998



## Faits saillants

- Pour l'ensemble des catégories de revenu, les proportions des naissances ayant un retard de croissance intra-utérine diminuent entre les périodes de 1989-1993 et 1994-1998. Néanmoins, l'écart entre les revenus élevés (6,8%) et faibles (10,3%) demeure constant à 3,5 %.
- Les plus fortes proportions de naissances ayant un retard de croissance intra-utérine se retrouvent dans les territoires de CLSC Parc-Extension, Pointe-Saint-Charles, Montréal-Centre-Sud et Hochelaga-Maisonneuve. Les proportions les plus faibles se situent dans les territoires semi-périphériques du centre-ville (Métro, Lasalle) et à l'ouest de l'île (Lac Saint-Louis et Pierrefonds).
- Faute de données sur les proportions de naissances ayant un retard de croissance intra-utérine pour les régions urbaines du Canada, seule une comparaison entre Montréal et les autres régions du Québec est possible. Il en ressort que la fluctuation des taux entre certaines régions du Québec concernant les retards de croissance est peu importante. Un fait est à mentionner : la proportion de naissances ayant un retard de croissance pour Montréal (8,9 %) est significativement supérieure à celle pour l'ensemble du Québec (8,6 %).